n° 49.

observation sur une fracture longitudinale

en 1791 au mois de mai le nommé j. C. troly agé de 17 ans, conduisoit un chariot chargé de pierre, et trainé par trois bons chevaux, sur l'un des quels il etoit assis. ces chevaux s'epouvanterent et emporterent rapidement la voiture; le conducteur tomba. une des roues du devant passa obliquement sur sa jambe gauche, a la quelle cette roue causa une violente contusion avec un epanchement considerable de sang, il fallut porter sur la voiture le blessé, qui ne put marcher après son accident. on le conduisit chez son maitre. je fus aussitot appellé; je reconnus au milieu de la contusion, dont j'ai parlé, un dechirement qu'avoit ocasionné un des cloux de la roue. en pressant la tumeur, je fis sortir tout le sang qui s'y trouvoit amassé, et j'y mis un appareil de compresses en plusieurs doubles, trempées dans l'eau marinée. les saignées du bras ne furent pas epargniés dans les premiers moments.

le landemain a la levée de l'appareil, la tumeure etoit egalement remplie de sang; l'engourdissement de la partie, la fievre,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 31 d 2
n° 49

l'inflammation, et le gorgement de toute la
jambe me firent craindre les suites. la
sonde creuse insinuée dans la plaie penetra —
jusqu'à la partie inferieure et interne du <u>tibia</u>
que je reconnus depourvu de son perioste, je fis —
la dilatation de la tumeur dans toute son etendue,
le sang sortit abondamment. la plaie fut tamponai de
charpie seche, et 24 heures après je reconnus
une fracture longitudinale de l'os du <u>tibia</u>, par
une fente qui etoit a cet os dans toute sa longueur;
le malade dit qu'il souffroit dans l'interieur de cet
os, qui fut en consequence perforé en plusieurs —
endroits, dans sa surface; il sortit de la cavité
de cet os, par les ouvertures beaucoup de sang
noir, enfin toute cette cavité fut decouverte depuis
la partie superieure, jusqu'a l'inferieure.

la crete de l'os se trouvoit dans toute sa longueur
decouverte et denuée de toute partie charnue,
je pris le parti de l'enlever avec les tenailles
incisive. la grande et profonde plaie qui en —
resultat dans l'os, ne fut pensée qu'avec de la
charpie seche trempée dans le beaume de
fioraventi. tous les deux ou trois jours, j'etois
obligé de porter dans le fond de cette plaie

le cautere actuel a raison de la mauvaise qualité des chairs fongueuse qui y croissoient. Au moyen de ces pansements, des saignées du bras employées dans les commencements, et des compresses epaisses trempées dans l'eau de vie camphrée, soutenues d'un bandage a dix huit chef, le malade s'est guerri dans la fin du mois d'8bre suivant, quoyque dans le cours de son pansement il lui survint, une galle canine qui se manifesta dans toute l'habitude de son corps, et dont il fut pareillement guerri par la diette, les boissons et remedes propres en pareilles circonstance. Vermillet

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE